

Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:



Dziecko:

- sprawia wrażenie niezdarnego
- ma słabą równowagę, potyka się częściej niż rówieśnicy
- podczas dłuższego siedzenia podpira głowę rękami, kładzie się na stoliku
- jest nadrucliwe
- trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza
- jest impulsywne
- w ocenie rodzica lub innych osób porusza się zbyt szybko lub za wolno,
- nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie,
- idąc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy
- wpada na ludzi, meble, obija się o futryny w drzwiach
- nieprawidłowo trzyma sztucce, kredki, nożyczki
- unika dotyku
- zatyka uszy, skarży się, że jest za głośno
- nie czuje, że się ubrudziło lub podwinęło mu się ubranie
- wydaje się, że jest ciągle w ruchu, trudno mu się wyciszyć
- przejawia duży lęk przed nawet niewielką wysokością – niechętnie huśta się nie huśtawce, unika drabinek
- często myli stronę prawą i lewą,
- ma słabe poczucie odległości, np. nie potrafi rzucić do celu, rzuca za mocno lub za słabo
- ma trudności z czytaniem i pisaniem, ma trudności w przepisywaniu z tablicy
- ma kłopoty z cięciem nożyczkami
- nie lubi rysować
- szybko się męczy, sprawia wrażenie wiotkiego, słabego
- ma chorobę lokomocyjną
- nie lubi karuzeli, huśtawek lub przeciwnie - korzysta z nich dużo dłużej niż rówieśnicy